

秋白菜栽培技术

发布人：李淑敏 时间：2018.07.30 来源：长春市农业信息中心



1、幼苗期管理 白菜第三次间苗在有 5—6 片叶子的时候，选留叶片形状和颜色与本品种特征相符，叶柄短而宽，有明显叶翅的幼苗，淘汰幼小和与原品种特性不符的苗，每掩留 2—3 株。在团棵时定苗，每掩留 1 株形态正常，生长最强健的苗。

此期要进行多次中耕除草，中耕深度原则是“头锄浅，二锄深，三锄不伤根”，水分要供应充足。

2、莲座期管理 定苗到拉筒前为莲座期。此期要适当控制水分进行蹲苗，7—10 天为宜。蹲苗时间长短根据雨水多少，土壤墒情和土壤保水性来定，在干旱少雨年份或保水性差的沙壤土 要适当减少蹲苗天数。

3、结球期管理 此期要保证水分充足供应，同时要防治病虫害。秋白菜生长期一般追肥 2 次。第一次在定苗后，每公顷追施尿素 50 公斤左右；第二次在拉筒后追肥，每公顷追施尿素 100—120 公斤左

右。最好在定苗后，莲座到拉筒期再喷施 2 次叶面肥。每次追肥最好结合灌水进行，或结合天气在雨前或雨后进行。