

## 露地番茄越夏管理技术

发布人：李淑敏 时间：2018.07.30 来源：中国蔬菜网



一、选择抗病耐热品种 根据当地条件，选择抗病、耐热、耐贮藏的高产的优质品种。

二、实施轮作 选择前茬没种过茄科蔬菜的生茬地块，最好与大田作物实行轮作，到无病区栽培，是番茄越夏栽培取得高产稳产的简便有效措施。大田地一般肥力较差，定植前要进行深翻，增施底肥，一般每亩施用农家肥 3000—5000 公斤，过磷酸钙 100 公斤，复合肥 30 公斤。

三、高畦地膜覆盖栽培 番茄越夏栽培一般要采用高垄或高畦地膜覆盖栽培。畦栽一般做成 20—25 厘米高的高畦，然后覆盖地膜。高畦地膜覆盖既有利于保水保肥，又有利于雨季排水，防病防衰。

四、培育壮苗，适当稀植 番茄越夏栽培一般都把采收期安排在 7—9 月份上市。番茄越夏栽培密度不宜过大，密度过大则通风透光

不良，田间郁闭，高温雨季易发生各种病害和植株早衰。一般畦宽 1.6 米（畦面宽 90 厘米，畦间 70 厘米作业道）栽两行、行距 50 厘米，株距 45 厘米，每亩仅栽 1900 株，各地可结合本地条件，适当稀植，一般每亩不超过 3000 株，定植时要做到壮苗深栽。

五、合理整枝、多层留果 番茄越夏栽培应实行大架栽培，多层留果。整枝可采用单干整枝或双干整枝。也可在春番茄生产的基础上，采用连续换头再生整枝法进行越夏栽培生产。单干整枝或双干整枝，或连续换头再生整枝，一般都要在霜期到来之前 50 天左右摘心打顶。以防青果不能成熟。摘心打顶一般要留两片功能叶，打顶不宜过早，过早易引起早衰，番茄越夏栽培一般单株结果 5—10 穗，20—30 个果实。

六、加强田间管理 番茄越夏栽培前期通过施底肥，适当蹲苗。促使根深叶茂，高温雨季到来之前，要注意调整好营养生长和生殖生长的平衡，适当疏花疏果，避免坠秧，保持植株旺盛生长。要及时摘除植株下部老叶、病叶。要加强晚疫病，病毒病和斑点病等病害的防治；要及时防治蚜虫，棉铃虫等虫害。高温多雨时，番茄易落花，可用 25—30ppm 的番茄灵蘸花或喷花，保花保果；尽量少用或不用 2，4-D 蘸花，减少畸形果数量。

七、及时采收 番茄越夏栽培一般从 7 月中旬开始采收，为避免烂果、裂果，应在果实开始转色变红时立即采收。