

玉米除草剂药害补救措施

发布人：赵新华 时间：2018.07.30 来源：中国玉米网



玉米除草剂尤其是苗后除草剂在喷施后会出现药害，轻微药害不需要处理，玉米生长只是暂时退绿或轻微的发育迟缓时几天后即可自行恢复正常生长，不会影响产量。如果药害较重则要采取一定措施进行补救。

一、补救措施：

1、加强田间管理。及时浇水、增施碳酸氢铵或尿素等速效性肥料，促使玉米根系吸收较多水分，促进玉米尽快恢复正常生长发育。适当中耕，增强土壤的通透性，增强玉米根系对水分和养分的吸收能力。

2、喷施植物生长调节剂或叶面施肥。在上午露水干后或傍晚喷施植物生长调节剂或叶面肥，可有效减轻药害，促进玉米恢复正常生长。

3、足量喷水或灌水，促进根系吸收，降低作物体内药物浓度，

缓解药害。对于施药过量的排出，能有效减轻药害。

二、解除玉米田茎叶除草剂的药害经验

1、玉米“马鞭状”、“拳头状”药害。人工辅助解除“马鞭状”、“拳头状”的外部形态，再施肥浇水，并结合喷施叶面肥或生长调节剂，能收到明显的效果。

2、一般轻型药害。加强肥水管理，可喷施叶面肥，生长调节剂能收到一定效果。

3、玉米茎叶干枯比较严重，但心叶尚未死亡。此类情况属触杀型药害，最有效的措施是先施肥，再浇水，尤其追施速效氮。

三、预防除草剂药害：

1、按照使用说明喷药。选用质量好的除草剂，严格按照使用说明适量、适时、适地施用。

2、苗势弱的玉米品种在施用除草剂时要适当降低药剂浓度。

3、注意除草剂使用期间的天气变化，在降水量大或大风、低温时不要施用。

4、减轻或避免玉米茎叶除草剂药害，简便易行的措施是定向或半定向喷雾；补救玉米茎叶除草剂药害，最有效的措施是加强肥水管理。